

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.



SK

Pred použitím predvídno preberte návod za uporabo.



Pre upotrebu pažljivo pročitajte uputstvo.



При застосуванні уважно прочітайте інструкцію з використання.



UK

Kullanılmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.



Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.



Prés prardation naudoti atžitią perskaitykite instrukcijas.



Erne tole kasumatim legada hoikkaik kasutamijuhdella.



GC MI Paste Plus

DENTÁLYN KRÉM NA LOKÁLNŤ APLIKÁCIJU V ÚSTACH S OBSAHOV VÁPNIKA, FOSFÁTU A FLUORÍDU

Na používanie v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

CHARAKTERISTIKA
GC MI Paste Plus je krém na báze vody, ktorý obsahuje RECALDENT™ s fluoridom (CPP-ACPF: fosforepoxid kaseína – amorfný fluoridový komplex vápenatý). Obsah fluoridu je 0,2% w/w (900ppm), približne rovnako ako v zubnej pasta. GC MI Paste Plus je aplikovaný do ustného prostredia sa CPP-ACPF viaže na bioplm, plak, baktérie, hydroxapatit a mákké tkanivo a lokalizuje svoje dostupné kationy, fosfát i fluorid.

DÔLEŽITÉ:
Slinene zvyšuje účinnosť CPP-ACPF a prichádza napomáha stimulovať vylučovanie sliny. Cím dlhšie sa CPP-ACPF a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

Pasta na lokálnu aplikáciu s obsahom vody dostupného kalcia, fosfátu a fluoridu
1. Poskytuje zubom zvýšenú ochranu.
2. Pomáha neutralizovať kyseliny z acidogénnych baktérií v plaku.
3. Pomáha neutralizovať kyseliny z druhých notrajníh a vonkajších zdrojov kyselín.

KONTRAINDIKÁCIE
Fosforepoxid kaseína sú odvodené z mliečnych kaseínov. Nepoužívajte tento materiál u pacientov s preukázanou alebo podozrivou alergiou na mliečny proteín alebo predčistenovosť, príp. alergiu na benzotiazolové konzervačné látky.

NAVODILA ZA UPORABO INDIKÁCIE
a. Po postopku bežnejho zuba v ambulanti.
b. Po ultrazvukovej čistení v stomatologickíh a glajerjuy korenine.
c. Po profesionálnom čistení zubu.
d. Prevencia in kontrola preobčívovosti.
e. Keď alternatívna metoda topikalnega nanosa fluoridu pri otroch starih 6 let in več.

NAVÓD NA POŽITIE INDIKÁCIE
a. Po ultrazvukovom, ručnom sočivoví alebo chladieni povrchu koreňa.
c. Po profesionálnom vyčistení zubov (PT.C).
d. Ako prevencia a kontrola hypersenzitivity.
e. Ako alternatívny spôsob miestnej aplikácie fluoridu u detí do 6 rokov.
f. V prípade ortodontickej lečby.
g. Požadujete pacienta, aby dôkladne vyplul ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu môže ponechať, aby sa postupne rozpýľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
h. Na miestne pokrývky (coating) u pacientov trpiacich eróziou, xerostomiou alebo sýgšeným syndrómom.
i. Pre dospejých pacientov s osobitnými potrebami.

Použitie v ambulanti:
1. Použitie bezsoľná pasta.
2. Nosič pred použitím dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
3. Vytlačte do nosiča väčšiu množstvo GC MI Paste Plus a naneste na povrch zubu.
4. Nošič nechajte najmenje 3 minúty v ústach pôsobiť.
5. Nošič vyberte.
5. Inštrujejte pacienta, aby zvyšok GC MI Paste Plus jazykom rozotrel v ústach a čo najdlhšie v ústach podržal (este 1-2 minúty) a usolval sa neprevyplávať ani neprehltať. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.
6. Požadujete pacienta, aby dôkladne vyplul ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu môže ponechať, aby sa postupne rozpýľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
7. Ihneď po použití treba zvyšky GC MI Paste Plus v šablone opláchnuť alebo vyčistiť kefkou pod tečúcou vodou.

II. Použitie bez soľnia:
1. Ak je to potrebné, nadvhynúť nosič na povrchu zubu odstrániť vatovým tampónom. V každom prípade NIE je potrebné vždy stlačiť stlačeným vzduchom.
2. GC MI Paste Plus naneste na povrch zubu aplikujúcim tampónom, prstom v rukavici alebo na ľadko prstýňným interproximálnym páčkom.
3. Pacient naj nato možno vyplnúť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.
4. Inštrujejte pacienta, aby zvyšok GC MI Paste Plus jazykom rozotrel po povrchu zubu.
5. Pacient naj nato možno vyplnúť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.

III. Uporaba brez modela:
1. Pri uporabi možno mešali močno sperite pod tekočo vodo.
2. Izničite zajebo kolčino GC MI Paste Plus v model in naneste na zgornje ali spodnje zobe.
3. Mešali postavite na mestu v ustih minimumo 3 minute.
4. Odstranite model.
5. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih.
6. Tako naj jo zdrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minúti), brez pljvjanja in požiranja. Dne časa kot sta GC MI Paste Plus in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
7. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.

IV. Navos po čiščenju zob podnevi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Naneste ustrezno količino GC MI Paste Plus na zgornje in spodnje zobe.
2. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.
3. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.

V. Navos po čiščenju zob ponoči po navodilih zobnega strokovnjaka
Navodilo:
Uporaba ponoči je posebej priporočena pri odraslih pacientih s visokim tveganjem, ni pa priporočena za otroke pod 12 let.
1. Naneste ustrezno količino GC MI Paste Plus na zgornje in spodnje zobe.
2. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.

VI. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

VII. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

VIII. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

IX. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

X. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

XI. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

DRUHY BALENÍ
Tuba s obsahom 40 g (35 mL)
1. Výberové balenie.
10 x 40 g (po 2 baleniach jahoda, melón, vanilka, máta, Tutti-Frutti)
2. Balenie s jednou príchutou
10 x 40 g z každých príchutí vanilka, jahoda, melón, Tutti-Frutti, máta
3. Balenie s náhradou náplvu
1 x 40 g tuba s každou príchutou

POZNÁMKA
GC MI Paste Plus s jedinečnou receptúrou CPP-ACPF voľba vynnúta na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne (The School of Dental Science, The University of Melbourne), v štáte Victoria, Austrálie.
*RECALDENT je obchodná značka používaná na základe licencie. K technológii CPP-ACPF sa vzťahujú patenty alebo nevyhnutné patentové prášky v Austrálii, na Novom Zélande, Európe, Kanade a USA.

UPOZORNENIE
1. Tubu po použití vždy uzavrite a odstráňte zvyšky pastej alebo tekutiny okolo trnu tuby alebo v uzáveru.
2. Tubu GC MI Paste Plus sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 6 rokov.
3. Dostupné použitie na noc sa neodporúča u pacientov mladších ako 12 rokov.
4. V prípade zasiatna oči ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
5. Prípadne náplvy na ome zvyčajne vodu.

6. V prípade, že sa objavia výskoky príznaky alergiou, môže to znamenať citlivosť alebo alergiu na benzotiazolové konzervanty, prípadne na niektorú inu zložku výrobku ako napr. ochucovacia zložka. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

Naposledy upravené : 02/2011

GC MI Paste Plus

TOPIKÁLNA KRÉMA S KALCIJEM, FOSFÁTOM A FLUORÍDOM

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

OPIS
GC MI Paste Plus je krema na bazi vode, ki vsebuje RECALDENT™ s inna fluoridom fluorid (CPP-ACPF: kazein fosforepoxid-amorfní kalcij fosfat fluorid). Nivo fluorida je 0,2% w/w (900ppm), kar je priblizno toliko kot v zobni pasta iz odrasle. Gc mi paste plus vsebuje fluorid, ki se veže na bioplim, plak, bakterije, hidroksapatit in mekko tkivo in lokalizira bio-prisoten kalcij, fosfat in fluorid.

ROMBEMBO:
Slina bo pospešila učinkovitost CPP-ACPF in okus bo pomagala stimulirati tok sline. Dje kot usta CPP-ACPF in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.

Trojalna pasta, ki vsebuje bio-prisoten kalcij, fosfat in fluorid
1. Zagotovi dodatno zaščito za zobe.
2. Pomaga neutralizirati vpliv kislinskih bakterij v plaku.
3. Pomaga neutralizirati kislino iz drugih notrajnih in zunanjih kislinskih virov.

KONTRAINDIKACIJE
Kazein fosforepoxid izhajajo iz mlečnega kazeina. Ne uporabljate tege materiala pri pacientih z dokazom ali sumom na alergijo na mlečne proteine in/ali preobčívovost ali alergijo na benzotiazol.

NAVODILA ZA UPORABO INDIKACIJE
a. Po postopku bežnejho zuba v ambulanti.
b. Po ultrazvukovíh čistení v stomatologickíh in glajerjuy korenine.
c. Po profesionálnem čiščenju zob.
d. Prevencia in kontrola preobčívovosti.
e. Keď alternatívna metoda topikalnega nanosa fluoridu pri otroch starih 6 let in več.

NAVÓD NA POŽITIE INDIKÁCIE
a. Po ultrazvukovom, ručnom sočivoví alebo chladieni povrchu koreňa.
c. Po profesionálnom vyčistení zubov (PT.C).
d. Ako prevencia a kontrola hypersenzitivity.
e. Ako alternatívny spôsob miestnej aplikácie fluoridu u detí do 6 rokov.
f. V prípade ortodontickej lečby.
g. Požadujete pacienta, aby dôkladne vyplul ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu môže ponechať, aby sa postupne rozpýľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
h. Na miestne pokrývky (coating) u pacientov trpiacich eróziou, xerostomiou alebo sýgšeným syndrómom.
i. Pre dospejých pacientov s osobitnými potrebami.

II. Použitie bez modela:
1. Pri uporabi možno mešali močno sperite pod tekočo vodo.
2. Izničite zajebo kolčino GC MI Paste Plus v model in naneste na zgornje ali spodnje zobe.
3. Mešali postavite na mestu v ustih minimumo 3 minute.
4. Odstranite model.
5. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih.
6. Tako naj jo zdrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minúti), brez pljvjanja in požiranja. Dne časa kot sta GC MI Paste Plus in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
7. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.
8. Inštrujejte pacienta, aby zvyšok GC MI Paste Plus jazykom rozotrel v ústach a čo najdlhšie v ústach podržal (este 1-2 minúty) a usolval sa neprevyplávať ani neprehltať. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.
9. Požadujete pacienta, aby dôkladne vyplul ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu može ponechať, aby sa postupne rozpýľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
7. Ihneď po použití treba zvyšky GC MI Paste Plus v šablone opláchnuť alebo vyčistiť kefkou pod tečúcou vodou.

III. Uporaba brez modela:
1. Pri uporabi možno mešali močno sperite pod tekočo vodo.
2. Izničite zajebo kolčino GC MI Paste Plus v model in naneste na zgornje ali spodnje zobe.
3. Mešali postavite na mestu v ustih minimumo 3 minute.
4. Odstranite model.
5. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih.
6. Tako naj jo zdrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minúti), brez pljvjanja in požiranja. Dne časa kot sta GC MI Paste Plus in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
7. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.
8. Inštrujejte pacienta, aby zvyšok GC MI Paste Plus jazykom rozotrel v ústach a čo najdlhšie v ústach podržal (este 1-2 minúty) a usolval sa neprevyplávať ani neprehltať. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.
9. Požadujete pacienta, aby dôkladne vyplul ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu može ponechať, aby sa postupne rozpýľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.

IV. Navos po čiščenju zob podnevi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Naneste ustrezno količino GC MI Paste Plus na zgornje in spodnje zobe.
2. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.
3. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.

V. Navos po čiščenju zob ponoči po navodilih zobnega strokovnjaka
Navodilo:
Uporaba ponoči je posebej priporočena pri odraslih pacientih s visokim tveganjem, ni pa priporočena za otroke pod 12 let.
1. Naneste ustrezno količino GC MI Paste Plus na zgornje in spodnje zobe.
2. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.

VI. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

VII. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

VIII. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

IX. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

X. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

XI. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použite na noc sa objavíť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie pre pacientov s nízkym rizikom.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus – najmenje vo veľkosti hrášku na každý obok – naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba poklovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ľadko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (este 1-2 minúty), potom nevyplávajte a neprehlтайте. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.

AKRANJE
Vesblna tube 40g (35mL)
4. Acortamin
10 x 40g (po 2 okusa jagode, melone, vanilje, minta, tutti-frutja)
2. Paket z enim okusom
10 x 40g vanilje, jagode, melone, tutti-frutja, minta
3. Dodani paket
1 x 40g tuba posameznega okusa

NAVODILO
GC MI Paste Plus s svojo edinstveno CPP-ACPF formulacijo je bila razvita v šoli The School of Dental Science, Univerza v Melbourne, Victorija, Avstralijs.
*RECALDENT je zaščitni znak, ki se uporablja pod licenco. CPP-ACPF tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstralijs, NZ, Evropi, Kanadi in ZDA.

OPROZORILO
1. Po uporabi vedno zaprite s pokrovčkom in odtrane preostalo pasto ali viago okrog vratu tube ali v ozroju pokrovčka.
2. Dostupno GC MI Paste Plus ni priporočljivo pri pacientih starih manj kot 6 let.
3. Namogo nanos ponoči ni priporočljivo za otroke stare manj kot 12 let.
4. V primeru stika z obleko, sperite z vodo.
5. V primeru stika z obleko, sperite z vodo.

6. V primeru prjava simptomov alergenda, lahko to kaže na občutljivost ali alergijo na benzotiazol ali katero drugo komponento izdelka kot je dodatek za zdravje. V tem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.

Zadnja izdaja : 02/2011

GC MI Paste Plus

ZUBNA KRÉMA SA BIORASPOLOŽIVIM KALCIJUMOM, FOSFATOM I FLUORIDOM

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučeni indikacijama.

OPIS
GC MI Paste Plus je krema na bazi vode koja sadrži RECALDENT™ s fluoridom (CPP-ACPF: kazein fosforepoxid-amorfní kalcijum fosfat fluorid). Nivo fluorida iznosi 0,2% w/w (900ppm), što odgovara prosječnoj vjetrodnosti zubne paste za odrasle. Pri primjeni CPP-ACPF u oralnom okruženju on se veže za bioplim, plak, bakterije, hidroksilatit i meko tkivo i otpušta biološki raspoloživ kalcijum, fosfat i fluorid.

VAŽNO:
Saliva poboljšava efikasnost CPP-ACPF, a aroma pomaže salivaciji. Što se duže CPP-ACPF i saliva zadržu u ustima, rezultat je bolji.

Površinska pasta koja sadrži biološki raspoloživ kalcijum, fosfat i fluorid
1. Pruža dodatnu zaštitu za zube.
2. Pomaže neutralizirati vpliv kislinskih bakterija u plaku.
3. Pomaže neutralizovanje izloženosti kiselini iz acidogenih bakterija u plaku.
4. Pomaže neutralizovanje izloženosti kiselini iz drugih unutrašnjih i spoljašnjih izvora kiseline.

KONTRAINDIKACIJE
Kazein fosforepoxid se dobija iz mlečnega kaseina. Ova materijal ne sme se koristiti kod pacijenata sa dokazanom ili sumptokom alergijom na mliečne proteine ili osetljivosti ili alergijom na benzotiazol konzervanse.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
INDIKACIJE
a. Po ultrazvukovíh čistení v stomatologickíh i glajerjuy korenine.
c. Po profesionálnem čiščenju zob.
d. Prevencia in kontrola preobčívovosti.
e. Keď alternatívna metoda topikalnega nanosa fluoridu pri otroch starih 6 let in več.
f. Med ortodontiskim zdravljenjem.
g. Pri pacijentih s visokim tveganjem za kariés.
h. Za zagotovitev topikalnega filma pri pacientih z eroziou, kserostomiou ali sýgšeným syndrómom.
i. Pri odraslih pacientih s posebnimi potrebami.

Nanos v ambulanti:
1. Uporaba pripravljeneja modela
1. Pri uporabi možno mešali močno sperite pod tekočo vodo.
2. Izničite zajebo kolčino GC MI Paste Plus v model in naneste na zgornje ali spodnje zobe.
3. Mešali postavite na mestu v ustih minimumo 3 minute.
4. Odstranite model.
5. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih.
6. Tako naj jo zdrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minúti), brez pljvjanja in požiranja. Dne časa kot sta GC MI Paste Plus i saliva zadržu v ustima, to je bolj rezultat.
7. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.
8. Inštrujejte pacienta, aby zvyšok GC MI Paste Plus jazykom rozotrel v ústach a čo najdlhšie v ústach podržal (este 1-2 minúty) a usolval sa neprevyplávať ani neprehltať. Cím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zdržia v ústach, tým je účinok väčší.
9. Požadujete pacienta, aby dôkladne vyplul ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu može ponechať, aby sa postupne rozpýľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
7. Ihneď po použití treba zvyšky GC MI Paste Plus v šablone opláchnuť alebo vyčistiť kefkou pod tečúcou vodou.

III. Uporaba brez modela:
1. Pri uporabi možno mešali močno sperite pod tekočo vodo.
2. Izničite zajebo kolčino GC MI Paste Plus v model in naneste na zgornje ali spodnje zobe.
3. Mešali postavite na mestu v ustih minimumo 3 minute.
4. Odstranite model.
5. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih.
6. Tako naj jo zdrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minúti), brez pljvjanja in požiranja. Dne časa kot sta GC MI Paste Plus i saliva zadržu v ustima, to je bolj rezultat.
7. Pacient naj nato možno izpljnuť, po možnosti brez spríngara. GC MI Paste Plus, ki ostane na površni se postopoma poragubí. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minút.
8. Inštrujejte pacienta, aby zvyšok GC MI Paste Plus j