

GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RADIOOPAKE GLASS IONOMER PROTECTION AND TEMPORARY RESTORATIVE MATERIAL IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the recommended indications.

- RECOMMENDED INDICATIONS**
- Fluoride protection.
 - Root surface protection.
 - Hyperplastic prevention and control.
 - Protection of the enamel cavity.
 - Temporary filling of endodontic space.
 - Interosseous restoration.
- CONTRAINDICATIONS**
- Pulp capping.
 - Avoid use of this product in patients with known glass ionomer cement hypersensitivity.

DIRECTIONS FOR USE
PINK SHADE is command set, **WHITE SHADE** is chemical set only

Powder / Liquid Ratio (g / g)	0,30 / 0,15
Mixing Time (sec.)	140*
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	1'40"
Net Setting Time (23°C/73°F) (min., sec.)	2'30"
Finishing Time (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.)	6'00"
Finishing Time / Light cure (PINK COMMAND SET) (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.)	4'00"

A FISSURE PROTECTION

ROOT SURFACE PROTECTION
HYPERSENSITIVITY PREVENTION AND CONTROL
PROTECTION FOR IMMATURE ENAMEL
 Preparation of the tooth surface (e.g. for fluoride protection or root surface protection)
 a) After cleaning the tooth surfaces prophylaxis with pumice and water / in usual manner, rinse thoroughly with water. Avoid aggravating the operculum.
 If extra retention is desired, application of **CAVITY CONDITIONER** (10 seconds) or **DENTIN CONDITIONER** (20 seconds) is recommended. CAVITY CONDITIONER should be rinsed off thoroughly after application.

2. Mixin
3. Place
4. Immediately after
5. Immediately remove
6. Immediately after
7. Place
8. Immediately after
9. Immediately after
10. Immediately after
11. Immediately after
12. Immediately after
13. Immediately after
14. Immediately after
15. Immediately after
16. Immediately after
17. Immediately after
18. Immediately after
19. Immediately after
20. Immediately after
21. Immediately after
22. Immediately after
23. Immediately after
24. Immediately after
25. Immediately after
26. Immediately after
27. Immediately after
28. Immediately after
29. Immediately after
30. Immediately after
31. Immediately after
32. Immediately after
33. Immediately after
34. Immediately after
35. Immediately after
36. Immediately after
37. Immediately after
38. Immediately after
39. Immediately after
40. Immediately after
41. Immediately after
42. Immediately after
43. Immediately after
44. Immediately after
45. Immediately after
46. Immediately after
47. Immediately after
48. Immediately after
49. Immediately after
50. Immediately after
51. Immediately after
52. Immediately after
53. Immediately after
54. Immediately after
55. Immediately after
56. Immediately after
57. Immediately after
58. Immediately after
59. Immediately after
60. Immediately after
61. Immediately after
62. Immediately after
63. Immediately after
64. Immediately after
65. Immediately after
66. Immediately after
67. Immediately after
68. Immediately after
69. Immediately after
70. Immediately after
71. Immediately after
72. Immediately after
73. Immediately after
74. Immediately after
75. Immediately after
76. Immediately after
77. Immediately after
78. Immediately after
79. Immediately after
80. Immediately after
81. Immediately after
82. Immediately after
83. Immediately after
84. Immediately after
85. Immediately after
86. Immediately after
87. Immediately after
88. Immediately after
89. Immediately after
90. Immediately after
91. Immediately after
92. Immediately after
93. Immediately after
94. Immediately after
95. Immediately after
96. Immediately after
97. Immediately after
98. Immediately after
99. Immediately after
100. Immediately after

- 1) If a faster set is desired, use a visible light curing device for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the cement surface. This function applies to the Pink Shade. After light cure, the adhesive resin is cured with a curing light.
- 2) In the direction of the nozzle, hold the applicator with the capsule towards you and turn the capsule body.
- 3) To remove
- 4) After placement, when the material starts to lose its glossy appearance (or after curing with the light curing device), apply a finishing coat of GC Fuji COAT LC (light cure) to the sealed area and the margins using a cotton pellet or sponge.
- 5) Finish under air/water spray can be performed 6 minutes from start of mix (chemically set) or 4 minutes if light cure. Use a superfine diamond bur or fine diamond bur with an air syringe (Fig. B-1).
- 6) Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC to the surface.

- B. TEMPORARY FILLING OF ENDODONTIC ACCESS**
1. Cleaning the pulp chamber
 2. After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).
 3. Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).
 4. See directions in A (above), Section 2.
 5. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 6. See directions in A, Section 3, d, e and f.

- C. INTERMEDIATE RESTORATIONS**
1. Remove caries and loose debris with hand instruments.
 2. For better retention, it is recommended to gently clean the carious surface with WHITE SHADE or PINK SHADE CONDITIONER for 20 seconds.
 3. After cleaning the tooth surface by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an air syringe (Fig. C-1), DO NOT DESICATE. Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening).
 4. Mixin
 5. Placement
 6. See directions in A, Section 3, a and b.
 7. Extrude the mixture directly over the cotton pellet (Fig. B-3).
 8. Polishing (Fig. A-8)
 9. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 10. See directions in A, Section 3, d, e and f.

- D. TEMPORARY FILLING OF ENDODONTIC ACCESS**
1. Cleaning the pulp chamber
 2. After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).
 3. Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).
 4. See directions in A (above), Section 2.
 5. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 6. See directions in A, Section 3, d, e and f.

- E. STORAGE**
- For optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
- PACKAGE**
- Single contents per capsule: 0.30 g powder and 0.15 g (0.12 mL) liquid Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.13 mL
- CAUTION**
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton swab in alcohol. Flush with water.
 2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
 3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
 4. In rare cases the product displays sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

- SHADE**
 Pink, White
- STORAGE**
 For optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
- PACKAGE**
 Single contents per capsule: 0.30 g powder and 0.15 g (0.12 mL) liquid Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.13 mL
- CAUTION**
 1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton swab in alcohol. Flush with water.
 2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
 3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
 4. In rare cases the product displays sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

- CEVETBOE**
 Rozov, Bel
- СХРАНЕНИЕ**
 За оптимальна ефективност е препоръчително, съхранявайте при температура 4-25°C (39,2-77,0°F).
- ПАКЕТИРОВАНИЕ**
 Средно съдържание на капсула: 0,30 г прах и 0,15 г (0,12 мл) течност. Минимален нето обем от смесения цемента в една капсула: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случай на контакт с орална тъкан или кожата, премахнете веществото с памучен тампон намокан в алкохол. Промийте с вода и носете очила и очна защита. Винаги носете защитна маска и очна защита.

- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с оральной тканью или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.
- УПАКОВКА**
 Среднее содержание материала в капсуле: 0,30 г порошка и 0,15 г (0,12 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного цемента в одной капсуле: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с ротовыми тканями или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.

- УПАКОВКА**
 Среднее содержание материала в капсуле: 0,30 г порошка и 0,15 г (0,12 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного цемента, выдаваемого из одной капсулы: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с ротовыми тканями или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.

- УПАКОВКА**
 Среднее содержание материала в капсуле: 0,30 г порошка и 0,15 г (0,12 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного цемента, выдаваемого из одной капсулы: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с ротовыми тканями или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.

- УПАКОВКА**
 Среднее содержание материала в капсуле: 0,30 г порошка и 0,15 г (0,12 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного цемента, выдаваемого из одной капсулы: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с ротовыми тканями или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.

GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН ГЛАС-ИОНОМЕР ЗА ЗАЩИТА И ВРЕМЕННОИ ВЪЗСТАВЯВАНИЕ В КАПУЛЫ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

- ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ**
- Защита на корончатата повърхност.
 - Защита на корончатата повърхност.
 - Препоръчителна профилактика и контрол.
 - Защита на незряла емал.
 - Временно отбурване на ендодонтния кавитет.
 - Интеросезионално възстановяване.
- КОНТРАИДИКАЦИИ**
- Пулпа капане.
 - Избягвайте този продукт при пациенти с доказана алергия към гласиомерни цемента.

DIRECTIONS FOR USE
PINK SHADE is command set, **WHITE SHADE** is chemical set only

Powder / Liquid Ratio (g / g)	0,30 / 0,15
Mixing Time (sec.)	140*
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	1'40"
Net Setting Time (23°C/73°F) (min., sec.)	2'30"
Finishing Time (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.)	6'00"
Finishing Time / Light cure (PINK COMMAND SET) (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.)	4'00"

A. ЗАЩИТА НА ФИСУРИ

ЗАЩИТА НА КОРОНЧАТА ПОВЪРХНОСТ
 Preparation of the tooth surface (e.g. for fluoride protection or root surface protection)
 a) After cleaning the tooth surfaces prophylaxis with pumice and water / in usual manner, rinse thoroughly with water. Avoid aggravating the operculum.
 If extra retention is desired, application of **CAVITY CONDITIONER** (10 seconds) or **DENTIN CONDITIONER** (20 seconds) is recommended. CAVITY CONDITIONER should be rinsed off thoroughly after application.

2. Mixin
3. Place
4. Immediately after
5. Immediately remove
6. Immediately after
7. Place
8. Immediately after
9. Immediately after
10. Immediately after
11. Immediately after
12. Immediately after
13. Immediately after
14. Immediately after
15. Immediately after
16. Immediately after
17. Immediately after
18. Immediately after
19. Immediately after
20. Immediately after
21. Immediately after
22. Immediately after
23. Immediately after
24. Immediately after
25. Immediately after
26. Immediately after
27. Immediately after
28. Immediately after
29. Immediately after
30. Immediately after
31. Immediately after
32. Immediately after
33. Immediately after
34. Immediately after
35. Immediately after
36. Immediately after
37. Immediately after
38. Immediately after
39. Immediately after
40. Immediately after
41. Immediately after
42. Immediately after
43. Immediately after
44. Immediately after
45. Immediately after
46. Immediately after
47. Immediately after
48. Immediately after
49. Immediately after
50. Immediately after
51. Immediately after
52. Immediately after
53. Immediately after
54. Immediately after
55. Immediately after
56. Immediately after
57. Immediately after
58. Immediately after
59. Immediately after
60. Immediately after
61. Immediately after
62. Immediately after
63. Immediately after
64. Immediately after
65. Immediately after
66. Immediately after
67. Immediately after
68. Immediately after
69. Immediately after
70. Immediately after
71. Immediately after
72. Immediately after
73. Immediately after
74. Immediately after
75. Immediately after
76. Immediately after
77. Immediately after
78. Immediately after
79. Immediately after
80. Immediately after
81. Immediately after
82. Immediately after
83. Immediately after
84. Immediately after
85. Immediately after
86. Immediately after
87. Immediately after
88. Immediately after
89. Immediately after
90. Immediately after
91. Immediately after
92. Immediately after
93. Immediately after
94. Immediately after
95. Immediately after
96. Immediately after
97. Immediately after
98. Immediately after
99. Immediately after
100. Immediately after

- 1) If a faster set is desired, use a visible light curing device for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the cement surface. This function applies to the Pink Shade. After light cure, the adhesive resin is cured with a curing light.
- 2) In the direction of the nozzle, hold the applicator with the capsule towards you and turn the capsule body.
- 3) To remove
- 4) After placement, when the material starts to lose its glossy appearance (or after curing with the light curing device), apply a finishing coat of GC Fuji COAT LC (light cure) to the sealed area and the margins using a cotton pellet or sponge.
- 5) Finish under air/water spray can be performed 6 minutes from start of mix (chemically set) or 4 minutes if light cure. Use a superfine diamond bur or fine diamond bur with an air syringe (Fig. B-1).
- 6) Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC to the surface.

- B. ВРЕМЕННО ОТБУРИВАНЕ НА ЕНДОДОНТИЧЕСКИ КАВИТЕТИ**
1. Cleanse the pulp chamber
 2. After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).
 3. Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).
 4. See directions in A (above), Section 2.
 5. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 6. See directions in A, Section 3, d, e and f.

- C. INTERMEDIATE RESTORATIONS**
1. Remove caries and loose debris with hand instruments.
 2. For better retention, it is recommended to gently clean the carious surface with WHITE SHADE or PINK SHADE CONDITIONER for 20 seconds.
 3. After cleaning the tooth surface by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an air syringe (Fig. C-1), DO NOT DESICATE. Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening).
 4. Mixin
 5. Placement
 6. See directions in A, Section 3, a and b.
 7. Extrude the mixture directly over the cotton pellet (Fig. B-3).
 8. Polishing (Fig. A-8)
 9. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 10. See directions in A, Section 3, d, e and f.

- D. TEMPORARY FILLING OF ENDODONTIC ACCESS**
1. Cleaning the pulp chamber
 2. After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).
 3. Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).
 4. See directions in A (above), Section 2.
 5. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 6. See directions in A, Section 3, d, e and f.

- E. STORAGE**
- For optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
- PACKAGE**
- Single contents per capsule: 0.30 g powder and 0.15 g (0.12 mL) liquid Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.13 mL
- CAUTION**
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton swab in alcohol. Flush with water.
 2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
 3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
 4. In rare cases the product displays sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

- SHADE**
 Rozov, Bel
- СХРАНЕНИЕ**
 За оптимальна ефективност е препоръчително, съхранявайте при температура 4-25°C (39,2-77,0°F).
- ПАКЕТИРОВАНИЕ**
 Средно съдържание на капсула: 0,30 г прах и 0,15 г (0,12 мл) течност. Минимален нето обем от смесения цемента в една капсула: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случай на контакт с орална тъкан или кожата, премахнете веществото с памучен тампон намокан в алкохол. Промийте с вода и носете очила и очна защита. Винаги носете защитна маска и очна защита.

- УПАКОВКА**
 Средное содержание материала в капсуле: 0,30 г порошка и 0,15 г (0,12 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного цемента в одной капсуле: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с ротовыми тканями или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.

- УПАКОВКА**
 Средное содержание материала в капсуле: 0,30 г порошка и 0,15 г (0,12 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного цемента, выдаваемого из одной капсулы: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с ротовыми тканями или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.

- УПАКОВКА**
 Средное содержание материала в капсуле: 0,30 г порошка и 0,15 г (0,12 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного цемента, выдаваемого из одной капсулы: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с ротовыми тканями или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.

- УПАКОВКА**
 Средное содержание материала в капсуле: 0,30 г порошка и 0,15 г (0,12 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного цемента, выдаваемого из одной капсулы: 0,13 мл.
- ВНИМАНИЕ**
 1. В случае контакта с ротовыми тканями или кожей, промойте ее ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой и носите защитные очки и защитную маску. Всегда носите защитную маску и очки.

GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RADIOOPAKI SKLONIONOMERNI ZAŠTITNI I PRIVREMENI RESTORATIVNI MATERIALI U KAPULAMA

K pouziti pouze za stomatologické praxi v doporučených indikcích.

- DOPORUČENÉ INDIKACE**
- Barzávedenie koria.
 - Zaštita površiny koria.
 - Prevenca a kontrola hypersenzitivity.
 - Zaštita na nezrelé emal.
 - Prívetimné endodontické zariadenie.
 - Interosézna obnovovanie.
- KONTRAINDIKÁCIE**
- Prekrvnenie pulpy.
 - Bezpečnosť produktu pre pacientov s prokázanou alergiou na sklonionomerné cementy.

DIRECTIONS FOR USE
PINK SHADE is command set, **WHITE SHADE** is chemical set only

Powder / Liquid Ratio (g / g)	0,30 / 0,15
Mixing Time (sec.)	140*
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	1'40"
Net Setting Time (23°C/73°F) (min., sec.)	2'30"
Finishing Time (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.)	6'00"
Finishing Time / Light cure (PINK COMMAND SET) (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.)	4'00"

A. OCHRANA FISSUR

PREVENCA A KONTROLA HYPERSENZITIVITY
 Preparation of the tooth surface (e.g. for fluoride protection or root surface protection)
 a) After cleaning the tooth surfaces prophylaxis with pumice and water / in usual manner, rinse thoroughly with water. Avoid aggravating the operculum.
 If extra retention is desired, application of **CAVITY CONDITIONER** (10 seconds) or **DENTIN CONDITIONER** (20 seconds) is recommended. CAVITY CONDITIONER should be rinsed off thoroughly after application.

2. Mixin
3. Place
4. Immediately after
5. Immediately remove
6. Immediately after
7. Place
8. Immediately after
9. Immediately after
10. Immediately after
11. Immediately after
12. Immediately after
13. Immediately after
14. Immediately after
15. Immediately after
16. Immediately after
17. Immediately after
18. Immediately after
19. Immediately after
20. Immediately after
21. Immediately after
22. Immediately after
23. Immediately after
24. Immediately after
25. Immediately after
26. Immediately after
27. Immediately after
28. Immediately after
29. Immediately after
30. Immediately after
31. Immediately after
32. Immediately after
33. Immediately after
34. Immediately after
35. Immediately after
36. Immediately after
37. Immediately after
38. Immediately after
39. Immediately after
40. Immediately after
41. Immediately after
42. Immediately after
43. Immediately after
44. Immediately after
45. Immediately after
46. Immediately after
47. Immediately after
48. Immediately after
49. Immediately after
50. Immediately after
51. Immediately after
52. Immediately after
53. Immediately after
54. Immediately after
55. Immediately after
56. Immediately after
57. Immediately after
58. Immediately after
59. Immediately after
60. Immediately after
61. Immediately after
62. Immediately after
63. Immediately after
64. Immediately after
65. Immediately after
66. Immediately after
67. Immediately after
68. Immediately after
69. Immediately after
70. Immediately after
71. Immediately after
72. Immediately after
73. Immediately after
74. Immediately after
75. Immediately after
76. Immediately after
77. Immediately after
78. Immediately after
79. Immediately after
80. Immediately after
81. Immediately after
82. Immediately after
83. Immediately after
84. Immediately after
85. Immediately after
86. Immediately after
87. Immediately after
88. Immediately after
89. Immediately after
90. Immediately after
91. Immediately after
92. Immediately after
93. Immediately after
94. Immediately after
95. Immediately after
96. Immediately after
97. Immediately after
98. Immediately after
99. Immediately after
100. Immediately after

- 1) If a faster set is desired, use a visible light curing device for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the cement surface. This function applies to the Pink Shade. After light cure, the adhesive resin is cured with a curing light.
- 2) In the direction of the nozzle, hold the applicator with the capsule towards you and turn the capsule body.
- 3) To remove
- 4) After placement, when the material starts to lose its glossy appearance (or after curing with the light curing device), apply a finishing coat of GC Fuji COAT LC (light cure) to the sealed area and the margins using a cotton pellet or sponge.
- 5) Finish under air/water spray can be performed 6 minutes from start of mix (chemically set) or 4 minutes if light cure. Use a superfine diamond bur or fine diamond bur with an air syringe (Fig. B-1).
- 6) Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC to the surface.

- B. ВРЕМЕННО ОТБУРИВАНЕ НА ЕНДОДОНТИЧЕСКИ КАВИТЕТИ**
1. Cleanse the pulp chamber
 2. After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).
 3. Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).
 4. See directions in A (above), Section 2.
 5. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 6. See directions in A, Section 3, d, e and f.

- C. INTERMEDIATE RESTORATIONS**
1. Remove caries and loose debris with hand instruments.
 2. For better retention, it is recommended to gently clean the carious surface with WHITE SHADE or PINK SHADE CONDITIONER for 20 seconds.
 3. After cleaning the tooth surface by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an air syringe (Fig. C-1), DO NOT DESICATE. Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening).
 4. Mixin
 5. Placement
 6. See directions in A, Section 3, a and b.
 7. Extrude the mixture directly over the cotton pellet (Fig. B-3).
 8. Polishing (Fig. A-8)
 9. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 10. See directions in A, Section 3, d, e and f.

- D. TEMPORARY FILLING OF ENDODONTIC ACCESS**
1. Cleaning the pulp chamber
 2. After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).
 3. Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).
 4. See directions in A (above), Section 2.
 5. If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as close as possible to the surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
 6. See directions in A, Section 3, d, e and f.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RADIOOPACNI SKLONOMERNY OCHRANNY A DOČASNY VÝPLŇOVÝ MATERIÁL V KAPŠULÁCH

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

- DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
1. Ochrana fisury.
2. Ochrana povrchu koróny.
3. Prevencia a kontrola hypersenzitívity.
4. Ochrana nevynutenej skloviny.
5. Dočasné endodontické zapечатenie.
6. Strešobné výplne.

- KONTRAINDIKÁCIE
1. Príjme prekrývajúce pulpy.
2. Vyhnete sa použitiu tohto materiálu u pacientov alergických na akrylové cementy.

NAVOD NA POUŽITIE

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes items like 'Dĺžka prúdu (mm)', 'Čas miešania (sek.)', 'Pracovná časť (23°C/73°F) (mm, sek.)', etc.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RADIOOPACNI STEKLASTO IONOMERNY ZAŠTITNI IZ ZAČASNI RESTAVRATIVNI MATERIAL V OBLIKU KAPŠULE


Uporaba sama za profesionalne namene in za priporocene indikacije.

- PRIPOROČENE INDIKACIJE
1. Ochrana fisury.
2. Zaščita površine korone.
3. Preprečitev in kontrola hypersenzitivnosti.
4. Zaščita nezrele glave.
5. Privremeno endodontsko zapечатje.
6. Vmesna restavracija.

- KONTRAINDIKACIJE
1. Zaščita pulpe.
2. Izogibanje uporabi proizvoda kod pacienata sa poznatom alergijom na akrylovne cemente.

NAVODILA ZA UPORABO

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes items like 'Nazivna gubica / testovna gubica (g)', 'Čas miešanja (sek.)', 'Pracovna časť (23°C/73°F) (mm, sek.)', etc.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RADIOOPACNI GLASJONOMERNI ZAŠTITNI I PRIVREMENI RESTAVRATIVNI MATERIAL U OBLIKU KAPŠULE

Samo za stručno stomatološko upotrebu u preporučenim indikacijama.

- PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Zaštita površine korone.
2. Zaštita površine završetka.
3. Sprječavanje i kontrola hypersenzitivnosti.
4. Zaštita nezrele glave.
5. Privremeno endodontsko zapечатje.
6. Vremena restavracija.

- KONTRAINDIKACIJE
1. Prekrivanje pulpe.
2. Izbjegavanje upotrebe proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na akrylovne cemente.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes items like 'Nazivna gubica / testovna gubica (g)', 'Čas miešanja (sek.)', 'Pracovna časť (23°C/73°F) (mm, sek.)', etc.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

РЕНТГЕНКОНТРАСТНИ СКЛОНОМЕРНИ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ЗАХИСНИХ РЕСТАВРАТИВНИ МАТЕРІАЛІ В ОБЛІКУ КАПСУЛ

Само за стручно стоматологічне використання в рекомендованих індикаціях.

- РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
1. Герметизація фісур.
2. Захист поверхні корони.
3. Захист поверхні завершення.
4. Захист незрілої глави.
5. Привремене ендодонтоко запечатення.
6. Вчасна реставрація.

- ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Перекриття пульпи.
2. Уникнення використання продукту у пацієнтів з підтвердженою алергічною реакцією на склоіономерні цементи.

ВАЗИВНИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes items like 'Смешивание порошков / гранул (г)', 'Время замешивания (сек.)', 'Рабочая часть (23°C/73°F) (мм, сек.)', etc.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RENTEGENKONTRASTNAI SKLONOMERNI CEMENT DLIJ ZAHISNIH KORPIRITIV TA TIMMOŠOVIV RESTAVRATIVNI V KAPŠULAH

Дли використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в індикаціях.

- РЕКОМЕНДОВАНИ ПОКАЗАННЯ
1. Герметизація фісур.
2. Захист поверхні корони.
3. Захист поверхні завершення.
4. Захист незрілої глави.
5. Привремене ендодонтоко запечатення.
6. Вчасна реставрація.

- ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Перекриття пульпи.
2. Уникнення використання продукту у пацієнтів з підтвердженою алергічною реакцією на склоіономерні цементи.

ВАЗИВНИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes items like 'Смешивание порошков / гранул (г)', 'Время замешивания (сек.)', 'Рабочая часть (23°C/73°F) (мм, сек.)', etc.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

KAPSULA FORMA RADOYAPAK KORUMA VE GEÇICI AMALCI ÇAM YIKANMA RESTAVRATÖR KAPŞULASINA

Sadece Diğ hekimlerin ve Diğ hekimlerin tarafından önerilen endikasyonlarda kullanılmalıdır.

- TAVSİYELİ ENDİKASYONLAR
1. Fısur örtme.
2. Sakın yüzünü koruma.
3. Açık hasıyatları örtme ve kontrol etme.
4. Tam gelişmiş minerey koruyucu örtme.
5. Tıbbi amaçlarla kullanılan dişlerin restorasyonu.
6. Ağız seyrek restorasyonu.

- KONTRAINDİKASYONLAR
1. Pulpayı örtme.
2. Bilinen veya şüphelenilen alerjik reaksiyonlar.

KULLANMA TALİMATI

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes items like 'Karıştırma Süresi (g)', 'Karıştırma Süresi (g)', 'Çalışma Süresi (23°C/73°F) (mm, sek.)', etc.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RENTEGENKONTRASTNĀS STIKLOJONOMERNĀS APSAUGĀEMS IR LAISZĀVĀJĀMĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJĀS

Skurtais tik gdytvytoji naudojami, pagal rekomenduojamas indikacijas.

- REKOMENDUOJAMI NIKOINDIKACIJOS
1. Vagiuji apaugai.
2. Ugniuji apaugai.
3. Jautriu danti apaugai ir kontrolė.
4. Nesuformuotai emalio apaugai.
5. Laikinas endodontinis ertmiu restoravimas.
6. Laikinas restoravimas.

- KONTRAINDIKACIJOS
1. Tiesioginis pulpos padengimas.
2. Alergijos reakcija į akrilinius cementus.

NAUDOJIMO BŪDAS

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes items like 'Mėšimo / vėsinimo trukmė (g)', 'Darbo laikas (23°C/73°F) (mm, sek.)', 'Viasa kietėjimo laikas (37°C/99°F) (mm, sek.)', etc.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RÖNTGENKONTRASTNE KLASIJONOMERNE KATEMATERIJAL JA LAISZAVAJAMAS PARGADU RESTAVRACIJA

Professionalskie kasutavimas hambarav. Naudojimas

- NAUDOJIMAS
1. Fissurų klijavimas.
2. Pajautriųjų hambarakė klijavimas.
3. Ugniuojamųjų hambarakė klijavimas.
4. Pajautriųjų hambarakė klijavimas.
5. Apmuštinėms klijavimas.
6. Alergijos odontodontinis klijavimas.
7. Laikinis endodontinis ertmių restoravimas.
8. Laikinis restoravimas.

- VASTUMUJIMAS
1. Pulpos klijavimas.
2. Vėsinimo klijavimas.

KASUTUSIUJHND

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes items like 'Publi / Vėdinimo trukmė (g)', 'Segavimo laikas', 'Tobulėjimo trukmė (23°C/73°F) (mm, sek.)', etc.

A. OCHRANA FISURY

CHORANA IZ KORUVIRAJU KORENA PREVENCAJA KONTROLA HYPERSENZITIVNOSTI OCHRANA NEVYNUJENI SKLOVINY

- 1. Pripraviť vzdušným spôsobom (profizialni pomocno pumpy a vody), povrch zubov dôkladne očistiť vodou. Vystrážiť sa poškodzenia emalium.
2. Mešanie
3. Umiestnenie
4. Pozri inštrukcie A, odst. 3 a b.

A. ZAŠCITA FISURE

ZAŠCITA KORONISKE POVRŠINE PREPREČEVANJE IN KONTROLA HYPERSENZITIVNOSTI OCHRANA NEVYNUJENI SKLOVINY

- 1. Pripraviť vzdušným spôsobom (profizialni pomocno pumpy a vody), povrch zubov dôkladne očistiť vodou. Vystrážiť sa poškodzenia emalium.
2. Mešanie
3. Umiestnenie
4. Pozri inštrukcie A, odst. 3 a b.

A. PEČAĆENJE FISURE

CHORANA IZ KORUVIRAJU KORENA PREVENCAJA KONTROLA PREGOSETLJIVOSTI ZAŠTITA NZRELE JELENI

- 1. Pripraviť vzdušným spôsobom (profizialni pomocno pumpy a vody), povrch zubov dôkladne očistiť vodou. Vystrážiť sa poškodzenia emalium.
2. Mešanie
3. Umiestnenie
4. Pozri inštrukcie A, odst. 3 a b.

A. FISSUR ÖRTÜCÜ

SANIKLI YERLERI KORUVIRAJU ASIRI HASASATYI ÖRTÜLCÜ VE KONTROL EDICI TAM GELİŞMİŞ MİRNE İÇİN KORUYUCU

- 1. Pripraviť vzdušným spôsobom (profizialni pomocno pumpy a vody), povrch zubov dôkladne očistiť vodou. Vystrážiť sa poškodzenia emalium.
2. Mešanie
3. Umiestnenie
4. Pozri inštrukcie A, odst. 3 a b.

A. FISUR ÖRTÜCÜ

SANIKLI YERLERI KORUVIRAJU ASIRI HASASATYI ÖRTÜLCÜ VE KONTROL EDICI TAM GELİŞMİŞ MİRNE İÇİN KORUYUCU

- 1. Pripraviť vzdušným spôsobom (profizialni pomocno pumpy a vody), povrch zubov dôkladne očistiť vodou. Vystrážiť sa poškodzenia emalium.
2. Mešanie
3. Umiestnenie
4. Pozri inštrukcie A, odst. 3 a b.

A. FISURAS AIZŠARŽĪBAS

SANIKLI YERLERI KORUVIRAJU ASIRI HASASATYI ÖRTÜLCÜ VE KONTROL EDICI TAM GELİŞMİŞ MİRNE İÇİN KORUYUCU

- 1. Pripraviť vzdušným spôsobom (profizialni pomocno pumpy a vody), povrch zubov dôkladne očistiť vodou. Vystrážiť sa poškodzenia emalium.
2. Mešanie
3. Umiestnenie
4. Pozri inštrukcie A, odst. 3 a b.

A. VAGELIU APSAUGA

SANIKLI YERLERI KORUVIRAJU ASIRI HASASATYI ÖRTÜLCÜ VE KONTROL EDICI TAM GELİŞMİŞ MİRNE İÇİN KORUYUCU

- 1. Pripraviť vzdušným spôsobom (profizialni pomocno pumpy a vody), povrch zubov dôkladne očistiť vodou. Vystrážiť sa poškodzenia emalium.
2. Mešanie
3. Umiestnenie
4. Pozri inštrukcie A, odst. 3 a b.

A. FISSURULE KATINĀS

SANIKLI YERLERI KORUVIRAJU ASIRI HASASATYI ÖRTÜLCÜ VE KONTROL EDICI TAM GELİŞMİŞ MİRNE İÇİN KORUYUCU

- 1. Pripraviť vzdušným spôsobom (profizialni pomocno pumpy a vody), povrch zubov dôkladne očistiť vodou. Vystrážiť sa poškodzenia emalium.
2. Mešanie
3. Umiestnenie
4. Pozri inštrukcie A, odst. 3 a b.

B. DOČASNE ENDOTONICKÉ ZAPĚTĚNĚ

Vyhášte iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

B. ZACASNE ENDOTONICKO PEČAĆENJE

Očistite pulpe komore. Kanal odpravljatej tretmaja pulpe, pulpu komoru očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

B. PRIVREMENO ENDOTONOSKO PEČAĆENJE

Očistite pulpe komore. Kanal odpravljatej tretmaja pulpe, pulpu komoru očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

B. ENDODONTIK KAVITELERINE GEÇICI DOLGULARI

Kanal odpravljatej tretmaja pulpe, pulpu komoru očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

B. PAGAIDU PLOMBE UD ENDOTONITIAS

Kanal odpravljatej tretmaja pulpe, pulpu komoru očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

B. LAIKINA ENDOTONIS ERTMES RESTAVRACIJA

Kanal odpravljatej tretmaja pulpe, pulpu komoru očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

B. AJUTISED ORTODONTULES KINNITUSED

Kanal odpravljatej tretmaja pulpe, pulpu komoru očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

B. AJUTISED RESTAVRACIJA

Kanal odpravljatej tretmaja pulpe, pulpu komoru očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

C. STREDOODOBE VYPLNE

Odvratite nuznyj nastrojnyj pokryvok od korony. Spravite iz pulpy komory otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

C. VESNESE RESTAVRACIJE

Odvratite nuznyj nastrojnyj pokryvok od korony. Spravite iz pulpy komory otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

C. PRIVREMENO ENDOTONOSKO PEČAĆENJE

Očistite pulpe komore. Kanal odpravljatej tretmaja pulpe, pulpu komoru očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

C. ORTA SEVİNE RESTORASYON

Odvratite nuznyj nastrojnyj pokryvok od korony. Spravite iz pulpy komory otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

C. PAGAIDU RESTAVRACIJA

Odvratite nuznyj nastrojnyj pokryvok od korony. Spravite iz pulpy komory otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

C. LAIKINOS RESTAVRACIJA

Odvratite nuznyj nastrojnyj pokryvok od korony. Spravite iz pulpy komory otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

C. AJUTISED RESTAVRACIJA

Odvratite nuznyj nastrojnyj pokryvok od korony. Spravite iz pulpy komory otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

C. AJUTISED RESTAVRACIJA

Odvratite nuznyj nastrojnyj pokryvok od korony. Spravite iz pulpy komory otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

D. OCHRANA VITKOSI A KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

D. ZAŠCITA VITKOSI I KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

D. PEČAĆENJE VITKOSI I KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

D. KORUVIRAJU KORUMU VE GEÇICI AMALCI ÇAM YIKANMA RESTAVRATÖR KAPŞULASINA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

D. KORUVIRAJU KORUMU VE GEÇICI AMALCI ÇAM YIKANMA RESTAVRATÖR KAPŞULASINA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

D. KORUVIRAJU KORUMU VE GEÇICI AMALCI ÇAM YIKANMA RESTAVRATÖR KAPŞULASINA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

D. KORUVIRAJU KORUMU VE GEÇICI AMALCI ÇAM YIKANMA RESTAVRATÖR KAPŞULASINA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

D. KORUVIRAJU KORUMU VE GEÇICI AMALCI ÇAM YIKANMA RESTAVRATÖR KAPŞULASINA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

E. VYKONAVNĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

E. VYKONAVNĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

E. VYKONAVNĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

E. VYKONAVNĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

E. VYKONAVNĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

E. VYKONAVNĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

E. VYKONAVNĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

E. VYKONAVNĀS PĀGARDU RESTAVRĀCIJA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

F. OCHRANA VITKOSI A KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

F. OCHRANA VITKOSI A KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

F. OCHRANA VITKOSI A KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

F. OCHRANA VITKOSI A KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

F. OCHRANA VITKOSI A KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.

F. OCHRANA VITKOSI A KONEČNA UPRAVA

Na upotrebu iz korovne otvory, očistite iz nežno osušite cementu. Ta funkcija se namena samo na PINK barvo. Po svetlobnem obsevanju je priporočila zaščita površine z premazom.